

Maßnahmen beachten bei der Anzeige von Interaktionen



Tagtäglich wird man in der Apotheke damit konfrontiert, dass verordnete und / oder freiverkäufliche Arzneimittel Wechselwirkungen haben. Um den Kunden bzw. Arzt nun optimal und pharmazeutisch kompetent in Bezug auf das weitere Vorgehen beraten zu können, unterstützen Sie die zahlreichen Informationen in der Interaktionsanzeige in jeglicher Hinsicht.

Wie Sie leicht und schnell an alle wichtigen Informationen kommen, lesen Sie hier.

Geben Sie die verordneten Arzneimittel und ggf. das zusätzlich gewünschte Medikament an der Kasse ein. Wenn eine Wechselwirkung vorliegt, werden Sie an der Kasse durch das blinkende Icon darauf aufmerksam gemacht. Mit Klick auf das Interaktions-Icon bekommen Sie weitere Informationen angezeigt.

Pharmatechnik-Apothek

Service: 08151 / 55 09 295

Bed + 10 | Bed. 1 | Bed. 2 | Bed. 3 | **Bed. 4** | Bed. 5 | Bed. 6 | Bed. 7 | Bed. 8 | Bed. 9 | Bed. 10

Online

Normal 0,00 € | Rezept 14,90 € | Privat 0,00 € | Total 14,90 €

12:24:32
Kasse 2

Kunde (keine Kundenzuordnung) | KK Techniker Krankenkasse | IK 103477503

Status 1 | Zuzahlungspfl./Mehrkostenpfl.

Na	Be	Bezeichnung	Dar	Einheit	Mg	VK	ZuMehr	Kunde
		Moxifloxacin Heu 400mg	Fta	7St	1	31,07	5,00	5,00
		Natrilix	Fta	100St	1	35,91	9,90	9,90
						0,00		0,00

Zwischensumme: 14,90 €

Rezept

1 / 2

Rohertrag: 9,14 | Festpreis: 31,01 | PZN: 02520011

ESC | STRG | ALT | Suchen | Rezepturen | Bestellung | Stückelung | Artikelinfo ABDA-DB | Risiko-Check | Packzettel | Faktura | Kalkulation

F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12

Es öffnet sich ein Fenster, indem die Wechselwirkung aufgeführt und klassifiziert ist (hier Überwachung/ Anpassung) und zusätzlich eine **Kurzinfo** über die Wechselwirkung.

Pharmatechnik-Apothek Service: 08151 / 55 09 295

Bed. + 10 | Bed. 1 | Bed. 2 | Bed. 3 | **Bed. 4** | Bed. 5 | Bed. 6 | Bed. 7 | Bed. 8 | Bed. 9 | Bed. 10

Kasse → Liste der Interaktionen (kundenbezogen)

Name	Vorname	Geburtsdatum	Geschlecht
Keine Kundenzuordnung		00. 00. 0000	

1 Treffer gefunden

Interaktionsgruppe 1	Klassifikation	Interaktionsgruppe 2
IA-Gruppe: Stoffe, die die QT-Zeit verlängern können Stoffe/FAM: NATRILIX FTA 100St auslös. Stoff: Indapamid	Überwachung/Anpassung	Antibiotika, QT-Zeit-verlängernde MOXIFLOXACIN HEU 400MG FTA FTA ; Moxifloxacin

Kurzinfo | Maßn. | Monogr. kompl. | Effekt | Mechanismus | Kommentar | Lit. | Bearbeitung | Betr. FAM | Betr. Stoffe

Klassifikation: Überwachung bzw. Anpassung nötig
Effekt: Erhöhtes Risiko von ventrikulären Tachykardien (Torsades de pointes)
Typ: Pharmakodynamische Interaktion geklärt
Mechanismus: Additive Effekte auf die kardiale Erregungsausbreitung

ESC | STRG/ALT | Übersicht (F 1) | Alter (F 2) | Geschlecht (F 3) | Erkrankung (F 4) | Allergien (F 5) | Interaktion (F 6) | Interaktion Nahrungsm. (F 7) | Vergleichs-suche (F 8) | Drucken (F 9) | Filter (F 10) | Warnung bearbeiten (F 11)

Weitere Informationen erhalten Sie über die Reiter Maßnahmen, Effekt, Mechanismus, etc.. Im Reiter **Maßnahmen**, werden Ihnen oft auch alternative Wirkstoffe für die Abgabe angeboten, welche Sie dem Kunden bzw. dem Arzt nennen können.

Bed. + 10 | Bed. 1 | Bed. 2 | Bed. 3 | **Bed. 4** | Bed. 5 | Bed. 6 | Bed. 7 | Bed. 8 | Bed. 9 | Bed. 10

Kasse → Liste der Interaktionen (kundenbezogen)

Name	Vorname	Geburtsdatum	Geschlecht
Keine Kundenzuordnung		00. 00. 0000	

1 Treffer gefunden

Interaktionsgruppe 1	Klassifikation	Interaktionsgruppe 2
IA-Gruppe: Stoffe, die die QT-Zeit verlängern können Stoffe/FAM: NATRILIX FTA 100St auslös. Stoff: Indapamid	Überwachung/Anpassung	Antibiotika, QT-Zeit-verlängernde MOXIFLOXACIN HEU 400MG FTA FTA ; Moxifloxacin

Kurzinfo | **Maßn.** | Monogr. kompl. | Effekt | Mechanismus | Kommentar | Lit. | Bearbeitung | Betr. FAM | Betr. Stoffe

Die gleichzeitige Behandlung mit mehreren QT-Zeit verlängernden Arzneistoffen soll möglichst vermieden werden. Ist sie unumgänglich, soll sie unter sorgfältiger elektrokardiographischer und eventuell stationärer Überwachung sowie in niedrigst wirksamer Dosierung vorgenommen werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QT_c-Zeit von mehr als 50 ms bzw. auf mehr als 500 ms sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Besonders bei prädisponierten Patienten (z. B. Diuretika-Therapie) wird empfohlen, das Serum-Kalium zu überwachen. Außerdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörung informiert werden und

ESC | STRG/ALT | Übersicht (F 1) | Alter (F 2) | Geschlecht (F 3) | Erkrankung (F 4) | Allergien (F 5) | Interaktion (F 6) | Interaktion Nahrungsm. (F 7) | Vergleichs-suche (F 8) | Drucken (F 9) | Filter (F 10) | Warnung bearbeiten (F 11)

Beachten Sie am Kassenschildschirm auch das schwarze Icon für Nahrungsmittel. Hier könnten wichtige Hinweise zu Nahrungsmitteln für den Kunden hinterlegt sein. z.B. gleichzeitige Anwendung mit Lakritze nicht empfohlen.

Diese Information erhalten Sie mit einem Klick auf das Nahrungsmittelicon.

The screenshot shows the Pharmatechnik-Apothek software interface. At the top, there is a navigation bar with icons and a status bar showing 'Service: 08151 / 55 09 295'. Below this is a grid of buttons labeled 'Bed. 1' through 'Bed. 10', with 'Bed. 4' highlighted in green. The main area displays a receipt for 'Kunde (keine Kundenzuordnung)' with a total of 14,90 €. The receipt lists two items: 'Moxifloxacin Heu 400mg' and 'Natrilix'. Below the receipt, there is a section titled 'Kasse → Liste der Interaktionen mit Nahrungsmitteln' which shows a warning: 'Gleichzeitige Anwendung nicht empfohlen' (Simultaneous use not recommended) between 'Diuretika, kaliuretische' (Diuretics, potassium-sparing) and 'Süßholzwurzel Lakritze' (Licorice root). The interface also includes a sidebar with 'Verkäufe' and 'Rezept' buttons, and a bottom status bar with 'ESC', 'STRG', and 'ALT' keys.

Na	Be	Bezeichnung	Dar	Einheit	Mg	VK	ZuMehr	Kunde
		Moxifloxacin Heu 400mg	Fta	7St	1	31,07	5,00	5,00
		Natrilix	Fta	100St	1	35,91	9,90	9,90
						0,00		0,00

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN
NATRILIX	FTA	100St	02520011

Interaktionsgruppe 1	Klassifikation	Interaktionsgruppe 2
Diuretika, kaliuretische NATRILIX FTA 100St auslös. Stoff Indapamid	Gleichzeitige Anwendung nicht empfohlen	Süßholzwurzel Lakritze